



COLOCAÇÃO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA QT

RECOMENDAÇÕES

» **APLICAR GELO NO LOCAL OPERADO NAS PRIMEIRAS 24H**
(não aplicar diretamente e não molhar o penso)

» **DEVERÁ RECORRER AO SEU CENTRO DE SAÚDE:**
REALIZAR PENSO
no 3º dia
RETIRAR PONTOS
no 7º dia após a cirurgia

CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

No dia seguinte à cirurgia, a equipa de enfermagem telefonará para saber do seu estado de saúde e para esclarecer todas as dúvidas que ainda possam existir.

CONTACTOS:

Dias úteis (08h às 22h)
Unidade de Cirurgia de Ambulatório - HPV

Tel.: 217 548 266

Dias úteis (22h às 08h)
Tel.: 925 422 874

Fins de semana e feriados
Tel.: 217 805 000 Ext.: 96260

Email:
secretariado.uca2@chln.min-saude.pt

Morada:
Alameda das Linhas de Torres, 117 1769-001 Lisboa




CHULN, EPE
Unidade de Cirurgia
de **Ambulatório**

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE
HOSPITAL PULIDO VALENTE

COLOCAÇÃO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA QT



DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Médico Assistente: _____

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



COLOCAÇÃO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA QT



ANTES DA CIRURGIA

NECESSITA DE ANÁLISES

(hemograma e estudo da coagulação) com menos de 3 meses

PARAR MEDICAÇÃO

anticoagulante e/ou antiagregante 5 dias antes da cirurgia, com conhecimento do seu médico assistente

SE APRESENTAR

tosse, expetoração, febre, diarreia ou vômitos deverá contactar o Departamento de Cirurgia Geral (HSM) pois poderá ter de adiar o procedimento

Telefone: 217 805 000 Ext.: 55558

DIA DA CIRURGIA

DEVE:

- » Comparecer na hora indicada de acordo com o agendamento da sua cirurgia
- » Trazer o seu historial médico (medicamentos que toma habitualmente, exames médicos recentes)
- » Ter cuidado especial com a sua higiene
- » Tomar o pequeno-almoço
- » Trazer roupa mais larga e calçado confortável

NÃO DEVE:

- » Trazer verniz nas unhas
- » Trazer acessórios (brincos, colares, pulseiras e anéis) ou objetos de valor

PRIMEIRAS 24 HORAS

PODE ACONTECER E É CONSIDERADO NORMAL:

- » Dor moderada no local operado
- » Penso do local operado com pequeno repasso de sangue

SE:

- » Tiver dores intensas no local operado
- » Penso do local operado muito repassado
- » Dificuldade ou dor ao respirar
- » Palpitações

DEVERÁ CONTACTAR O SEU MÉDICO DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA GERAL TELEFONE INTERNO N.º

OU RECORRER AO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA CENTRAL DO HOSPITAL SANTA MARIA